

# **Tăieri de primăvară la vița de vie: reguli de aur pentru a obține o recoltă bogată în toamnă**

La vița de vie, tăierea coardelor de prisos se face primăvara timpuriu, înainte de umflarea mugurilor (pornirea în vegetație). Se știe că lăsată liberă fără a se interveni prin tăiere, vița de vie, o liană, sub influența polarității manifestă tendința de a-și ridica de la an la an vegetația către vârf, degarnisindu-se la bază.

**Sunt sisteme diferite de tăieri, adaptate la timpul de plantație, la felul cum sunt conduse coardele**

Spre exemplu în **plantațiile clasice**, cu butuci deși (distanțele de plantare 1,5 – 2 m), în care vițele sunt susținute pe araci sau spalier cu 3-4 sârme, se practică tăierea tipică „în verigi de rod”. Veriga de rod este alcătuită din cuplul cep + coardă. La un butuc în plin rod (vârsta 5-6 ani) se lasă 2-3 cepi cu câte 2-3 ochi fiecare și 3-4 coarde cu câte 10-12 ochi viabili fiecare. Cepii se lasă din lemnul tânăr, crescut direct din butuc și trebuie să fie situați cât mai jos și dacă se poate orientați pe direcția rândului. Cepul cu 2-3 ochi trebuie să aibă o lungime de maxim 8-10 cm, pentru a nu se ridica prea mult „scaunul” butucului.

Coardele de rod se lasă în funcție de vigoarea butucului și potențialul productiv. La un butuc în plin rod sunt suficienți 50-60 ochi care se obțin din 4 coarde cu câte 12-15 ochi sau 3 coarde cu câte 16-18 ochi fiecare. Tăietura, atât la cepi cât și la coarde, se execută „pe diafragmă”, adică prin mijlocul unui mugure pentru ca scurgerile de sevă să fie cât mai mici.

Principiul de bază care se are în vedere la tăierea viței de vie este că strugurele se formează pe lăstar de un an, crescut pe lemn în vârstă de doi ani. Deci, din ochii aflați pe butuc vor ieși lăstarii care în anul viitor vor fi cepi. Prin tăiere se lasă acești cepi la 2-3 ochi și din aceștia vor da lăstari care constituie viitoarele coarde. Pe lăstarii dați din ochii acestor coarde se vor forma strugurii. De reținut ideea că cepii se lasă din lemnul crescut direct din butuc. În lipsa cepilor din anul trecut se lasă coarde de tip „bici” și „călăraș” pe lemn vechi. Această situație trebuie să fie numai pentru 1-2 ani, deoarece conduce la aspectul de „corcănire” (coarde bătrâne);

**La vițele conduse pe spalier, dar sub formă înaltă** – cordon bilateral sau cap înălțat – se practică o tăiere scurtă, adică pe fiecare cordon se lasă verigi de rod alcătuite din cepi la 1-2 ochi și cordițe la 5-6 ochi. Sarcina de rod se apreciază în funcție de vigoarea butucului și poate fi de 50-60 ochi pe butuc.

### **Reguli generale de care se ține seama la executarea tăierilor**

-La tăiere se lasă coarde de rod care au o grosime cuprinsă între 6 și 12 mm la care fertilitatea potențială a mugurilor este mai mare;

-Scurtarea coardelor se va face imediat deasupra ochiului pentru a reduce cât mai mult pierderile de sevă brută;

-Scurtarea prin internod lasă o porțiune mai lungă deasupra ochiului care se va usca și va deveni un bun adăpost pentru boli și dăunători;

-În fiecare an tăierile trebuie să fie executate numai pe o singură parte a lemnului multianual pentru a evita crearea de obstacole în calea circulației normale a sevei aceasta circulând doar pe partea sănătoasă lipsită de răni;

– Suprimarea coardelor se face la 2-3 mm deasupra punctelor de

insertie;

-Cepul de înlocuire trebuie să se găsească în poziție inferioară față de coarda de rod cât mai aproape de lemnul multianual ;

-Trebuie evitate tăieturile fără rost iar rănille care rezultă trebuie să aibă o suprafață cât mai mică.

**Pentru informații complete privind toate tipurile de tăieri la vița de vie, puteți descărca un material în format PDF accesibil la acest [LINK – Tăieri viță de vie.pdf](#)**

Sursa: [agrointel.ro](http://agrointel.ro)